



Pellet Alcoholismo
Tratamiento efectivo contra el alcohol

PELLET ALCOHOLISMO

CUIDADOS POSTERIORES DEL TRATAMIENTO DE PELLET DE DISULFIRAM

El tratamiento de implante de pellet, es de naturaleza ambulatoria y dura aproximadamente 30 minutos. El Dr. explicará al paciente sobre el tratamiento e indicará que es un apoyo médico complementario a su decisión de cesar de beber alcohol para luego proceder al implante. Una vez realizado el procedimiento, el paciente no podrá beber alcohol y deberá evitar ciertos alimentos y elementos para prevenir la reacción del medicamento entre los cuales se encuentran: náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, reacción alérgica, intoxicación. El efecto del medicamento se prolongará dependiendo de la degradación del mismo por parte del cuerpo del paciente.

Cuidados posteriores:

- Consumir los medicamentos profilácticos indicados por el médico.
- Mantener el contorno de la herida aseada con agua y jabón.
- No apretar ni pellizcar la herida de ningún modo.
- Se sugiere no realizar actividades físicas que impliquen esfuerzo o presionen la herida por el tiempo de cicatrización de ésta (aproximadamente 5 a 7 días).
- No ingerir "bebidas alcohólicas" ni "cerveza sin alcohol" sin antes revisar en el informe que ésta última contenga 0,0 alcohol.
- Evitar ingerir vinagre, mostaza, ají, salsas y todos los alimentos y bebidas que contengan alcohol y/o fermenten, como por ejemplo: manzana, uva, naranja, alimentos "en escabeche", pebre, curanto y similares. Se recomienda informarse sobre la naturaleza de los alimentos antes de consumirlos para que éstos no causen efectos adversos* .
- Evitar utilizar de manera externa elementos que contengan alcohol, tales como: alcohol tópico, desodorantes con alcohol, perfumes con alcohol (puede aplicarlos en su ropa pero que no tenga contacto directamente con la piel), etcétera. Buscar alternativas libres de etanol.
- No consumir jarabes ni flores de Bach que contengan alcohol. Si necesita ingerir alguno de estos medicamentos, pida una alternativa sin alcohol a su profesional tratante.
- Si incurre en el consumo o aplicación de algún elemento que produzca reacciones adversas, suspéndalo inmediatamente e ingiera abundante agua para disminuir la reacción.

Cómo ha sido informado previamente a la realización del tratamiento, el paciente podría presentar las siguientes reacciones adversas*: Infección, rechazo al implante, reacción alérgica. Si presenta alguno de estos síntomas, contáctenos. Recuerde asistir a su control oportunamente, el cual debe agendar con anterioridad, de esta manera disminuirá la posibilidad de que estas situaciones se presenten y/o agraven. Recuerde que es normal que la zona del implante se inflame, enrojezca, endurezca. Es parte del proceso normal de adaptación del organismo a un cuerpo extraño.

Modalidad de asistencia remota: para asistir de manera remota a sus consultas, hágalas a contacto@pelletalcoholismo.cl. Si son relativas a su tratamiento, adjunte foto de la zona y síntomas para derivar al médico.